



معلومات عن علاج الليزر لفتح القزحية المحيطية

ما هو علاج الليزر لفتح القزحية المحيطية؟

"هو إجراء بالليزر يُستخدم لعلاج أو منع حالة تُسمى "الجلوكوما ضيقة الزاوية (LPI) علاج الليزر لفتح القزحية المحيطية يقوم بإحداث ثقب صغير في القزحية (الجزء الملون من عينك) لمساعدة السائل على التصريف بشكل أفضل. يساعد ذلك في خفض الضغط داخل عينك وحماية رؤيتك

لماذا يتم إجراؤه؟

تمتلك العين نظام تصريف طبيعي يتدفق منه السائل. إذا كان فتحة نظام التصريف ضيقة جدًا أو مسدودة، فقد يرتفع الضغط داخل العين بسرعة ويسبب إلى العين - تُعرف هذه الحالة بـ "الجلوكوما ضيقة الزاوية". يُوصى غالبًا بعلاج الليزر لفتح القزحية المحيطية لمنع هذا النوع من الجلوكوما قبل حدوثها

ما الذي يحدث أثناء الإجراء؟

يتم عادةً إجراء العملية في العيادة. لا يستغرق سوى بضع دقائق

- قطرات العين ستخدر عينك
- سيتم وضع عدسة لاصقة خاصة على عينك
- باستخدام الليزر، يتم عمل ثقب صغير في القزحية (الجزء الملون من عينك)
- قد تشعر بقرصة سريعة أو لسعة مع كل نبضة ليزر

بعد الإجراء

- سيتم فحص ضغط العين بعد مدة قصيرة
- قد يتم إعطاؤك قطرات عين لبضعة أيام
- قد تكون رؤيتك مشوشة أو حساسة للضوء لفترة قصيرة
- موعد متابعة لفحص العينين

المخاطر والآثار الجانبية

علاج الليزر لفتح القزحية المحيطية آمن جدًا. بعض الآثار الجانبية المحتملة تشمل

- تشوش الرؤية المؤقت أو شعور خفيف بعدم الارتياح
- التهاب خفيف (احمرار أو انتفاخ)
- حساسية للضوء أو وهج



- نادرًا، ارتفاع مؤقت في ضغط العين أو نزيف خفيف

متى يجب الاتصال بطبيب العيون؟

.اتصل بعيادتك إذا كان لديك ألم متزايد، تغييرات في الرؤية، أو أي مخاوف بعد العلاج بالليزر

الأسئلة الشائعة

س: هل يؤلم؟

ج: معظم الناس يشعرون فقط بعدم ارتياح خفيف أو لا يشعرون بأي شيء. نبضات الليزر سريعة جدًا وليست مؤلمة عادةً

س: هل سأحتاج إلى قطرات الجلوكوما بعد العلاج؟

ج: قد تحتاج إلى قطرات العين بعد علاج الليزر لفتح القزحية المحيطة، بناءً على ضغطك ونتائج الفحص الأخرى للعين.
سيوجهك طبيبك

س: هل سيظل الثقب مفتوحًا للأبد؟

ج: عادة، نعم. قد يقوم طبيبك بفحصه بعد 1-2 أسبوع من الإجراء. في حالات نادرة، قد يُغلق الثقب مرة أخرى وقد يحتاج إلى فتحه مرة أخرى بإجراء ليزر آخر

.تمت مراجعة هذا المستند من قبل الدكتور ستيف أرشينو