



علاج الليزر للعتامة الخلفية للكبسولة

ما هي العتامة الخلفية للكبسولة؟

بعد جراحة إزالة المياه البيضاء، قد يتكون لدى بعض الأشخاص طبقة غائمة خلف العدسة الجديدة. يُطلق على ذلك ليست خطيرة، لكنها قد تجعل رؤيتك ضبابية مرة أخرى، بشكل مشابه لما كانت (PCO) "العتامة الخلفية للكبسولة" عليه قبل جراحة المياه البيضاء.

ما هو العلاج؟

العلاج بالليزر هو إجراء سريع وغير مؤلم يقوم بإزالة الطبقة الغائمة خلف العدسة. يتيح هذا مرور الضوء بشكل صحيح مرة أخرى ويجعل رؤيتك أوضح.

لماذا يتم ذلك؟

قد تحتاج إلى العلاج بالليزر إذا أصبحت رؤيتك ضبابية مرة أخرى بعد جراحة إزالة المياه البيضاء. يمكن لطبيب العيون التحقق مما إذا كانت هذه هي سبب الرؤية الضبابية لديك.

ماذا يحدث أثناء الإجراء؟

يتم الإجراء في العيادة أثناء استيقاظك. يستغرق بضع دقائق

- سيتم توسيع بؤبؤ العين بواسطة القطرات
- قد ترى أضواء ساطعة أو تشعر بضغط خفيف
- الإجراء غير مؤلم
- يمكنك العودة إلى المنزل فوراً بعده. قد تكون رؤيتك ضبابية لبضع ساعات

ماذا يجب أن أتوقع بعد العلاج؟

- يلاحظ معظم الناس رؤية أوضح في غضون 1-2 يوم
- قد ترى بقعًا غائمة لعدة أيام
- يمكن لمعظم الناس العودة إلى الأنشطة اليومية في نفس اليوم

المخاطر والآثار الجانبية

- إنزعاج خفيف أو تهيج في العين
- بقع غائمة
- ارتفاع قصير المدى في ضغط العين



- في حالات نادرة جدًا: تورم في العين، انفصال الشبكية، أو تلف في عدسة الزرع

متى يجب الاتصال بطبيب العيون؟

:اتصل بالعيادة فوراً إذا لاحظت

- ألم في العين يزداد سوءاً
- زيادة كبيرة في البقع العائمة أو الأضواء الومضية
- فقدان مفاجئ للرؤية

الأسئلة الشائعة

س: هل يؤلم العلاج بالليزر؟

ج: لا، معظم الناس لا يشعرون بأي ألم. قد ترى ضوءاً ساطعاً أو تشعر بضغط خفيف، لكن الإجراء سريع ومريح.

س: هل يمكن أن تعود الطبقة الغائمة؟

ج: بمجرد أن يقوم الليزر بإزالة الطبقة الغائمة، فإنها عادة لا تعود. معظم الناس يحتاجون إلى العلاج مرة واحدة فقط.

تمت مراجعة هذا المستند من قبل الدكتور ستيف أرشينوفا.