



# 激光治療後囊混濁患者資訊表

## 甚麼是後囊混濁？

在白內障手術後，有些人會在新晶體後方發展出一層混濁的膜。這稱為「後囊混濁」（PCO）。它並不危險，但它會使您的視力再次變得模糊，類似於您在白內障手術前的情況。

## 甚麼是治療方法？

激光是一種快速且無痛的程序，能清除晶體後的混濁層。這樣可以使光線再次正常通過，令您的視力更清晰。

## 為甚麼需要進行治療？

如果在白內障手術後您的視力再次變得模糊，您可能需要激光治療。您的眼科醫生可以檢查這是否是導致您視力模糊的原因。

## 手術過程中會發生甚麼？

- 手術在您清醒時於診所進行
- 只需幾分鐘
- 您的眼睛會被滴入擴瞳劑
- 您可能會看到亮光或感到輕微的壓力
- 手術不會痛
- 您可以在手術後立即回家。您的視力可能會模糊幾小時

## 手術後會怎樣？

- 大多數人在 1-2 天內會注意到視力變得更清晰
- 您可能幾天內會看到漂浮物
- 大多數人可在當天恢復正常活動



## 風險和副作用

- 眼睛輕微不適或刺激
- 漂浮物
- 眼壓短期上升
- 極少：眼睛腫脹、視網膜脫落或晶體植入物的損傷

## 何時應聯絡您的眼科醫生

如果您注意到以下症狀，請立即聯絡您的診所：

- 眼痛加重
- 漂浮物或閃光燈突然增多
- 突然失去視力

## 常見問題

Q: 激光治療會痛嗎？

A: 不，大多數人沒有任何疼痛感。您可能會看到亮光或感到輕微的壓力，但這個過程快速且舒適。

Q: 混濁層會不會再生嗎？

A: 一旦激光清除掉混濁層，它通常不會再生。大多數人只需要接受一次治療。

這份文件由 Dr. Steve Arshinoff 医生審核。