



激光治疗后囊混浊信息手册

什么是后囊混浊（PCO）？

在白内障手术后，有些人的新人工晶状体后面会形成一层混浊层，这称为“后囊混浊”（PCO）。它并不危险，但可能会使视力再次变得模糊，类似白内障手术前的情况。

什么是治疗方法？

激光是一种快速且无痛的过程，可以清除晶状体后面的混浊层。这让光线可以再次正常通过，使您的视力更清晰。

为什么要进行这种治疗？

如果您的视力在白内障手术后再次变得模糊，您可能需要进行激光治疗。您的眼科医生可以检查这种模糊视力是否由后囊混浊引起。

手术过程中会发生什么？

- 在诊所进行，全程清醒。过程只需几分钟。
- 您的眼睛会用眼药水进行散瞳。
- 过程中您可能会看到强光或轻微的压力感。
- 手术并不疼痛。
- 您可以在手术后立即回家，几小时内可能会模糊视力。

术后会怎样？

- 大多数人会在 1 至 2 天内注意到视力变得更清晰。
- 您可能几天内会看到“飞蚊”类的漂浮物。
- 大多数人可以在同一天恢复正常活动。

风险和副作用

- 轻微的眼部不适或刺激
- 漂浮物



- 短期内眼压升高
- 极少情况下会出现眼部肿胀，视网膜脱离，或晶体植入物损伤

何时联系您的眼科医生

如果您注意到以下情况，请立即联系您的诊所：

- 眼痛加剧
- 漂浮物/飞蚊或闪光明显增多
- 突然视力丧失

常见问题

Q: 激光治疗会疼吗？

A: 不会，大多数人不会感到任何疼痛。您可能会看到强光或感到轻微的压力，但手术过程快速且舒适。

Q: 混浊层会不会再出现吗？

A: 激光清除混浊层后，它通常不会再出现。大多数人只需要治疗一次。

本文档由 Dr. Steve Arshinoff 博士审阅。